

?

Каретою швидкої допомоги в клініку доставлена хвора 46-ти років зі скаргами на кровотечу протягом 6 годин після видалення зуба, загальну слабкість, запаморочення. В анамнезі – гіпертонічна хвороба. Об'єктивно: блідість шкіри і видимих слизових оболонок. У крові: Hb - 80г / л, Ht - 30%, показники часу кровотечі та згортання крові знаходяться в межах норми. Яке ускладнення розвинулося у хворої у зв'язку з кровотечею?

- + Постгеморагічна анемія
- Гемолітична анемія
- Залозодефіцитна анемія
- Фолієводефіцитна анемія

?

У хворого у порожнині рота спостерігається повна атрофія сосочків язика, язик червоний, лакований, вкритий виразками. В крові лейкопенія, зсув формули вправо, КП 1,3, мегалоцити, тільця Жолі. Для якої патології це характерно?

- Агранулоцитоз
- Гемолітична анемія
- Залізодефіцитна анемія
- Залізорезистентна анемія
- + В12-дефіцитна анемія

?

Чоловік тривалий час хворів гемобластозом. На розтині виявлено, що кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору. Проведено гістохімічну реакцію Перлса. Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні і гістіоцитарні елементи цих органів містять гранули синього кольору. Який пігмент виявлено при застосуванні зазначеної реакції?

- + Гемосидерин
- Білірубін
- Гематоїдин
- Гематоїдин
- Гематопорфірин

?

При гістологічному дослідженні збільшеного шийного лімфатичного вузла відмічено, що загальний малюнок вузла нечіткий за рахунок розростання гістіоцитарних клітин, з наявністю гігантських клітин Березовського-Штернберга, є ділянки некрозу, склерозу, гіалінозу. Для якого захворювання характерні виявлення морфологічні зміни в лімфатичному вузлі?

- + Лімфогранулематоз
- Грибоподібний мікоз
- Туберкульоз
- Хронічний мієлолейкоз
- Гострий мієлолейкоз

?

У жінки 22 років виявлені збільшені лімфатичні вузли. Гістологічне дослідження вузла виявило лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі і великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни?

- Лімфосаркома
- Гострий лейкоз
- Метастаз раку
- + Лімфогранулематоз
- Хронічний лейкоз

?

При розтині жінки 35-ти років поряд зі збільшенням багатьох лімфатичних вузлів була виявлена збільшена селезінка вагою 600,0; на розрізі неоднорідна, темно-червоного кольору, щільна, з ділянками некрозів сірувато-жовтуватого кольору, в діаметрі до 1 см. Про яке захворювання можна думати?

- + Лімфогранулематоз
- Хронічний лімфоїдний лейкоз
- Лімфосаркома
- Хронічний мієлоїдний лейкоз
- Метастази раку

?

При дослідженні біоптату збільшених шийних лімфатичних вузлів виявлена проліферація лімфоцитів, ретикулярних клітин, гістіоцитів, великих і малих клітин Ходжкіна, багатоядерних клітин Березовського-Штернберга, численні еозинофіли, поодинокі осередки казеозного некрозу тканини лімфатичного вузла. Який найбільш імовірний діагноз?

- + Лімфогранулематоз
- Лімфосаркома
- Метастаз раку легенів
- Гострий лейкоз
- Туберкульоз

?

У крові хворого загальна кількість лейкоцитів $90 \times 10^9 / л$. В лейкоцитарній формулі: е. - 0%, б. - 0%, ю. - 0%, п. - 2%, з - 20%, лімфобласти - 1%, пролімфоцити - 2%, лімфоцити - 70%, м. - 5%, є клітини Боткіна- Гумпрехта. Клінічно: збільшені шийні, підщелепні лімфатичні вузли. Для якої патології характерна така клінічна картина?

- Хронічний мієлолейкоз
- Лімфогранулематоз
- Гострий лімфолейкоз
- Інфекційний мононуклеоз
- + Хронічний лімфолейкоз

?

При обстеженні хворого 35 років проведено гістологічне дослідження пунктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. До яких змін периферійної крові це призведе?

- Лейкопенія
- Агранулоцитоз
- Лейкоцитоз
- Тромбоцитоз
- + Тромбоцитопенія

?

Чоловік тривалий час хворів гемобластозом. На розтині виявлено, що кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору. Проведено гістохімічну реакцію Перлса. Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні і гістіоцитарні елементи цих органів містять гранули синього кольору. Який пігмент виявлено при застосуванні зазначеної реакції?

- + Гемосидерин
- Білірубін
- Гематоїдин
- Гематоїдин
- Гематопорфірин

?

При дослідженні біоптату збільшеного шийного лімфатичного вузла виявлена стертість малюнка, тканина його представлена великою кількістю проліферуючих лімфоцитів з домішками поодиноких клітин Березовського- Штернберга. Ці зміни свідчать про таке захворювання :

- Лімфосаркома
- Нодулярно-склеротичний варіант лімфогранулематозу
- Лімфогранулематоз з виснаженням лімфоїдної тканини
- Змішано-клітинний варіант лімфогранулематозу
- + Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини