

Тести до теми 3

Дітовбивство вважається у випадках:

- + вбивство новонародженого матір`ю під час пологів або відразу після них
- вбивство немовляти батьком
- «присипання» немовляти матір`ю
- вбивство новонародженого сторонньою особою, родичами батька або матері
- правильний варіант відсутній

Доказом новонародженості є:

- + непорушене сполучення пуповини з плацентою
- наявність плаценти
- розміри голівки
- довжина плоду
- позитивні гідростатичні проби

Причинами смерті при пасивному дітовбивстві можуть бути:

- + переохолодження дитини
- задушення руками
- крововтрата при ушкодженнях тіла
- травматичний шок

Якому місяцю внутрішньоутробного розвитку відповідає виявлення мікроскопічно у міконії пушкового волосся та кристалів холестерину:

- + 5–8 місяцю
- 9–10 місяцю
- 3–4 місяцю
- 4–5 місяцю

Кефалогематома розсмоктується через:

- + 2–3 тижні
- 2–3 дні
- 5–6 днів
- 4–6 тижнів

На якому місяці внутрішньоутробного розвитку уперше з`являється ядро скостеніння у грудині:

- + 5–6 місяці
- 3–4 місяці
- 7–8 місяці
- 8–9 місяці

Плавальна легенева проба може бути негативною у живонароджених немовлят у випадках:

- + вторинного ателектазу
- повного розмерзання замерзлого трупа немовляти
- штучного вдування повітря
- аспірації навколоплідними водами

Доказом новонародженості є:

- + кефалогематома
- розміри голівки
- довжина плоду
- позитивні гідростатичні проби

Дітовбивство може бути:

- + активне
- навмисне
- ненавмисне

- як нещасний випадок

Зрілість плода – це:

- + ступінь фізичного розвитку плода
- час перебування плода в утробі матері
- ознака життєздатності немовляти
- ознака живонародженості новонародженого

На якому місяці внутрішньоутробного розвитку уперше з`являються ядра Бекляра у стегновій кістці:

- + на 9 місяці
- на 4 місяці
- на 7 місяці
- на 8 місяці

Меконій видаляється у новонароджених:

- + у перші дві доби
- на четверту – п`яту добу
- на шосту – сьому добу
- на першому – другому тижні

Рівень стояння діафрагми у живонороджених дітей відповідає:

- + шостому міжреберрю
- четвертому ребру
- четвертому міжреберрю
- шостому ребру

Доказом зрілості є:

- + ядра скостеніння
- волога, соковита пуповина
- відсутність пушкового волосся у ділянці лопаток
- позитивні гідростатичні проби

Розрив пуповини внаслідок стрімких пологів звичайно розташований:

- + на відстані 10-15 см від плаценти
- на відстані 2-3 см від пупкового кільця
- посередині пуповини
- правильний варіант відсутній

Ушкодження кісток черепа у новонароджених можуть виникати під час падіння з висоти не менше за:

- + 50 см
- 20 см
- 40 см
- 30 см

Яка локалізація не є характерною для ядер Бекляра:

- + у верхньому епіфізі стегновій кістки
- у ручці грудини
- у нижньому епіфізі стегнової кістки
- у п`ятковій кістці

Причинами смерті при пасивному дітовбивстві можуть бути:

- + неперевазана пуповина
- задушення руками
- крововтрата при ушкодженнях тіла
- травматичний шок

Через скільки годин після пологів повітря може бути знайдене у тонкому кишечнику немовляти:

- + п'ять – шість годин
- дев'ять – десять годин
- сім – вісім годин
- десять – дванадцять годин

Доказом зрілості є:

- + ядра скостеніння
- соковита пуповина
- наявність сировидного мастила
- нігті на верхніх кінцівках доходять до кінчиків пальців

Доказом новонародженості є:

- + непорушне сполучення пуповини з вологою, блискучою, вологою плацентою
- розмір головки
- довжина плоду
- позитивні гідростатичні проби

Судово-медичне дослідження трупів новонароджених відрізняється від дорослих людей:

- + технікою проведення розтину
- проведенням плавальних проб
- визначенням давності настання смерті
- не проводиться забір крові та сечі на вміст алкоголю

Рівень стояння діафрагми у мертвонароджених відповідає:

- + четвертому міжребер'ю
- четвертому ребру
- шостому ребру
- шостому міжребер'ю

Ядро скостеніння у грудині вперше з'являється у:

- + ручці
- тілі
- мечоподібному відростку
- правильний варіант відсутній

Доношенність плода – це:

- + час перебування в утробі матері
- ступінь розвитку немовляти
- ознака життєздатності
- ознака живонародженості

Доказом зрілості є:

- + горизонтально розташований шлунок
- непорушне сполучення пуповини з плацентою
- наявність плаценти
- звурджене молоко у шлунку

Основними ознаками новонародженості не є:

- + ядра Бекляра
- волога соковита пуповина
- пологове мастило на тілі
- пологова пухлина

Пуповина звичайно відпадає через:

- + 4–5 днів

- 1–2 дні
- 2–3 дні
- 10–14 днів

Виявлення у міконії мікроскопічно пушкового волосся та плоского епітелію відповідає наступному місяцю внутрішньоутробного розвитку:

- + 9–10 місяців
- 4–5 місяців
- 5–6 місяців
- 7–8 місяців

Наявність у шлунку новонародженого звурдженого молока свідчить про:

- + догляд
- життєздатність
- живонародженість
- зрілість

Нежиттєздатність плода не залежить від:

- + причини смерті
- дефектів розвитку
- незрілості
- недоношеності

Що не є доказом зрілості:

- + позитивні гідростатичні проби
- лануго
- наявність міконію
- еластичні хрящі вух та носа

Скільки часу минуло після пологів, якщо навколо пуповини гістологічно визначається демаркаційне кільце:

- + 6–12 годин
- 2–3 години
- 16–20 годин
- 22–24 години

На восьмому місяці внутрішньоутробного розвитку ядро скостеніння у грудині спостерігається у:

- + ручці й першому сегменті
- ручці
- ручці й мечоподібному відростку
- першому сегменті
- мечоподібному відростку

Плавальна легенева проба може бути негативна у живонароджених у випадках:

- + вторинний ателектаз
- при неповному розмерзанні замерзлого трупа
- вдування повітря
- аспірації жировидним мастилом
- правильний варіант відсутній

Що не є ознакою зрілості плода:

- + правильний варіант відсутній
- ядра скостеніння
- горизонтально розташований шлунок
- розміри голівки

Доказом новонародженості є:

- + сліди крові на тілі, без ушкоджень
- яєчка опущені у калитку
- довжина плоду
- позитивні гідростатичні проби

Що не є ознакою зрілості плода:

- + довжина плоду
- нігті на верхніх кінцівках виходять за краї пальців
- нігті на нижніх кінцівках доходять до країв пальців
- у дівчат великі статеві губи прикривають малі й клітор

На якому місяці внутрішньоутробного розвитку з`являється ядро скостеніння у п`ятковій кістці:

- + 5 місяці
- 4 місяці
- 7 місяці
- 8 місяці

Плавальна легенева проба може бути позитивною у мертвнонароджених у випадках:

- + усі варіанти правильні
- повному розмерзанні замерзлого трупа
- штучної вентиляції легень
- аспірації навколоплідної води

Доказом новонародженості є:

- + сироподібне мастило
- довжина волосся на голові не менше за 2 см
- зурджене молоко у шлунку
- позитивні гідростатичні проби