

Тести до теми 4

Дітовбивство вважається у випадках:

- + вбивство новонародженого матір'ю під час пологів або відразу після них
 - вбивство немовляти батьком
 - «присипання» немовляти матір'ю
 - вбивство новонародженого сторонньою особою, родичами батька або матері
- правильний варіант відсутній

Доказом новонародженості є:

- + непорушене сполучення пуповини з плацентою
- наявність плаценти
- розміри голівки
- довжина плоду
- позитивні гідростатичні проби

Причинами смерті при пасивному дітовбивстві можуть бути:

- + переохолодження дитини
- задушення руками
- крововтрата при ушкодженнях тіла
- травматичний шок

Кефалогематома розсмоктується через:

- + 2–3 тижні
- 2–3 дні
- 5–6 днів
- 4–6 тижнів

На якому місяці внутрішньоутробного розвитку уперше з'являється ядро скостеніння у грудині?

- + 5–6 місяці
- 3–4 місяці
- 7–8 місяці
- 8–9 місяці

Плавальна легенева проба може бути негативною у живонароджених немовлят у випадках:

- + вторинного ателектазу
- повного розмерзання замерзлого трупа немовляти
- штучного вдування повітря
- аспірації навколоплідними водами

Доказом новонародженості є:

- + кефалогематома
- розміри голівки
- довжина плоду
- позитивні гідростатичні проби

Дітовбивство може бути:

- + активне
- навмисне
- ненавмисне
- як нещасний випадок

Зрілість плода – це:

- + ступінь фізичного розвитку плода
- час перебування плода в утробі матері
- ознака життєздатності немовляти
- ознака живонародженості новонародженого

На якому місяці внутрішньоутробного розвитку уперше з'являються ядра Бекляра у стегновій кістці:

- + на 9 місяці
- на 4 місяці
- на 7 місяці
- на 8 місяці

Меконій видаляється у новонароджених:

- + у перші дві доби
- на четверту – п'яту добу
- на шосту – сьому добу
- на першому – другому тижні

Рівень стояння діафрагми у живонароджених дітей відповідає:

- + шостому міжребер'ю
- четвертому ребру
- четвертому міжребер'ю
- шостому ребру

Доказом зрілості є:

- + ядра скостеніння
- волога, соковита пуповина
- відсутність пушкового волосся у ділянці лопаток
- позитивні гідростатичні проби

Розрив пуповини внаслідок стрімких пологів звичайно розташований:

- + на відстані 10-15 см від плаценти
- на відстані 2-3 см від пупкового кільця
- посередині пуповини
- правильний варіант відсутній

Ушкодження кісток черепа у новонароджених можуть виникати під час падіння з висоти не менше за:

- + 50 см
- 20 см
- 40 см
- 30 см

Причинами смерті при пасивному дітовбивстві можуть бути:

- + неперев'язана пуповина
- задушення руками
- крововтрата при ушкодженнях тіла
- травматичний шок

Доказом зрілості є:

- + ядра скостеніння
- соковита пуповина
- наявність сироподібного мастила
- нігті на верхніх кінцівках доходять до кінчиків пальців

Судово-медичне дослідження трупів новонароджених відрізняється від дорослих людей:

- + технікою проведення розтину
- проведенням плавальних проб
- визначенням давності настання смерті
- не проводиться забір крові та сечі на вміст алкоголю

Рівень стояння діафрагми у мертвонароджених відповідає:

+ четвертому міжреберррю
четвертому ребру
шостому ребру
шостому міжреберррю

Доношеність плода – це:
+ час перебування в утробі матері
ступінь розвитку немовляти
ознака життєздатності
ознака живонародженості

Пуповина звичайно відпадає через:
+ 4–5 днів
1–2 дні
2–3 дні
10–14 днів

Наявність у шлунку новонародженого звурдженого молока свідчить про:
+ догляд
життєздатність
живонародженість
зрілість

Що не є доказом зрілості:
+ позитивні гідростатичні проби
лануго
наявність меконію
еластичні хрящі вух та носа

Плавальна легенева проба може бути негативна у живонароджених у випадках:
+ вторинний ателектаз
при неповному розмерзанні замерзлого трупа
вдування повітря
аспірації жироподібним мастилом
правильний варіант відсутній

Доказом новонародженості є:
+ сліди крові на тілі, без ушкоджень
яєчка опущені у калитку
довжина плоду
позитивні гідростатичні проби

Плавальна легенева проба може бути позитивною у мертвнонароджених у випадках:
+ усі варіанти правильні
повному розмерзанні замерзлого трупа
штучної вентиляції легень
аспірації навколоплідної води

Доказом новонародженості є:
+ сироподібне мастило
довжина волосся на голові не менше за 2 см
звурджене молоко у шлунку
позитивні гідростатичні проби