

«Крок-1» до теми 16

У дитини 10 років, яка була прооперована з приводу гострого апендициту, на 2-3 добу в післяопераційній рані з'явилася грануляційна тканина, а на 10 добу сформувався ніжний рубець. Вкажіть, який з перерахованих процесів найбільш вірогідний.

+ Загоєння первинним натягом

Найпростіше загоєння

Загоєння вторинним натягом

Загоєння під струпом

В результаті дорожньо-транспортної пригоди хворий В., 36 років, отримав відкритий перелом кісток гомілки. У процесі зрощення в місці перелому утворилась надмірна кісткова мозоль. До якого виду регенерації слід віднести утворення надлишкової кісткової мозолі?

+ Патологічна регенерація

Реституція

Репаративна регенерація

Субституція

Фізіологічна регенерація

Після відкритого осколкового перелому стегнової кістки утворилась рана з виділенням гною та кістковими секретами. Грануляційна тканина з країв суха, бліда. Про яку регенерацію йде мова?

+ Патологічну регенерацію

Реституцію

Фізіологічну регенерацію

Субституцію

Регенераційну гіпертрофію

Чоловік 74 років помер від хронічної серцевої недостатності. Під час аутопсії в серці виявлений старий постінфарктний рубець. Гістологічно: ділянки фіброзу, гіпертрофія кардіоміоцитів. Проявом якої регенерації є описані зміни?

+ Субституції

Промислової регенерації

Фізіологічної регенерації

Реституції

Метаплазії

У дитини після падіння утворилося невелике садно на коліні, яке через деякий час повністю епітелізувалось. Яка форма регенерації мала місце в такому випадку?

+ Клітинна регенерація

Фізіологічна регенерація

Внутрішньоклітинна регенерація

Репаративна регенерація

Регенераторна регенерація

До патогістологічного відділення надісланий шматочок тканини шлунку з виразкою. Під час гістологічного дослідження в стінці виразки виявлені: некроз і лейкоцити, грануляційна тканина, надмірний розвиток сполучної тканини та метаплазія епітелію слизової в краях виразки. Про який вид регенерації свідчать ці зміни?

+ Спотворена патологічна регенерація з порушенням зміни фаз

Гіпертрофія

Фізіологічна регенерація

Повна репаративна регенерація (реституція)

Неповна репаративна регенерація (субституція)

Після падіння у дитини виник перелом однієї з кісток правого передпліччя, через деякий час настало загоєння. Назвіть форму регенерації та клітини, які брали в цьому участь.

+ Репаративна регенерація, остеокласти і остеобласти

Фізіологічна регенерація, остеокласти

Внутрішньоклітинна регенерація, остецити
Клітинна регенерація, остеобласти та остеокласти
Патологічна регенерація, остеокласти

Назвіть форму регенерації серцевого м'яза при інфаркті міокарда та вкажіть її джерело.

+ Репаративна регенерація, фібробласти
Фізіологічна регенерація, кардіоміоцити
Внутрішньоклітинна регенерація, кардіоміоцити
Клітинна регенерація, фібробласти
Патологічна регенерація, фібробласти і кардіоміоцити

У хворого після глибоких опіків шкіри утворились келоїдні рубці. До якого виду патологічних процесів відносяться ці утворення?

+ Неповна регенерація (субституція)
Повна регенерація (реституція)
Метаплазія
Гіпертрофія
Атрофія

У хворого з ампутованою нижньою кінцівкою в культі з'явилися хворобливі вузлики. Під час мікроскопічного дослідження виявлені ампутаційні неврони. До якого загальнопатологічного процесу відносяться ці утворення?

+ Патологічна регенерація
Повна репаративна регенерація
Запалення
Неповна репаративна регенерація
Метаплазія

У хворого глибока рвана рана з нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових ділянках соковита грануляційна тканина, яка не піднімається над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани.

+ Вторинним натягом
Під струпом
Миттєвим натягом
Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини
Первинним натягом

Після травматичного ушкодження печінки згодом відбулося повне відновлення її будови і функції. Як називається такий вид регенерації?

+ Реституція
Неповна регенерація
Патологічна регенерація
Звичайна фізіологічна регенерація
Субституція

До патоморфологічного відділення надійшов шматочок тканини з краю хронічної виразки шлунку. Під час гістологічного дослідження в ньому виявлено: некроз, грануляційну тканину, надлишковий розвиток волокнистої сполучної тканини та метаплазію епітелію. Який вид компенсаторно-пристосувального процесу відбувся в цьому випадку?

+ Патологічна регенерація з порушенням зміни фаз
Гіпертрофія
Фізіологічна регенерація
Репаративна регенерація (субституція)
Репаративна регенерація (реституція)

У хворого глибока рвана рана з нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових ділянках – соковита грануляційна тканина, яка не підіймається над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани.

+ Загоєння вторинним натягом
Загоєння первинним натягом

Загоєння під струпом
Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини
Організація рани

У хворого глибока рвана рана з нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових ділянках соковита грануляційна тканина, яка не підіймається над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани.

+ Загоєння вторинним натягом

Організація

Загоєння первинним натягом

Загоєння під струпом

Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини

У хворого на цукровий діабет, після оперативного втручання (розкриття абсцесу в задній ділянці шиї) загоєння рани йшло протягом 1,5 місяців, з рани постійно відокремлювався гнійний вміст. Після загоєння рани на її місці утворився грубий рубець. Яким видом загоєння відбувалося загоєння рани?

+ Вторинним

Під струпом

Епітелізація

Первинним

Змішаним